


چاول کی بہتر اور بھرپور پیداوار

ایگری ٹیک کے تارا SSP کے ہریگ پرسیکوریٹی
سیل مہیا کردی گئی ہے جو اصل تارا SSP کی پہچان ہے۔
سیکوریٹی سیل اوپر والی سلائی کے درمیان دیکھی جاسکتی ہے۔



یقینی فاسفورس کے ساتھ ساتھ چسپم (سلفر اور کیلشیم) مہیا کرنے والی ایک منفرد اور انتہائی تیزابی کھاد

چاول کی بہتر، بھرپور اور اعلیٰ کوالٹی کی پیداوار کے لئے دوسرے زرعی عوامل کے ساتھ ساتھ کھادوں کا پورا، مناسب اور متوازن مقدار میں بروقت استعمال بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کے بعد فصلوں کے لئے ضروری چوتھا اہم غذائی عنصر سلفر ہے۔ ہماری زمینوں کا درجہ تعامل (pH) اساسی ہے۔ پاکستان میں چاول کی فصل کھڑے پانی میں (کدو کی حالت میں) کاشت کی جاتی ہے۔ اس دوران کھڑے پانی (کدو) کی وجہ سے زمین میں کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں سلفر، زنک اور کارپروغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے اور اس طرح دوسرے غذائی اجزاء کی پودوں کو فراہمی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سفید اور کالے کلروالی زمینوں میں ہوا اور پانی کا گزر کم ہو جاتا ہے اور زمینیں سختی کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ان مندرجہ بالا وجوہات کے پیش نظر ایک ایسی کھاد کا استعمال جو زمینوں کی زرخیزی، صحت، اصلاح، غیر موزوں پانی میں نمکیات کے اثرات کو زائل کرنے اور فصلات کی بہتر اور بھرپور پیداوار کے لئے زیادہ مناسب ہو بہت ضروری ہے۔

تاراسپر دانے دار (سنگل سپر فاسفیٹ دانے دار 18 فیصد) کے استعمال کے فوائد:

- ☆ تاراسپر دانے دار میں 18 فیصد یقینی قابل حصول فاسفورس۔
- ☆ تاراسپر دانے دار انتہائی تیزابی پی ایچ (کم درجہ تعامل) والی کھاد ہماری اساسی، پکی اور کلراٹھی زمینوں کے لئے زیادہ بہتر اور موزوں ترین۔
- ☆ تاراسپر دانے دار کے مناسب مقدار میں استعمال سے پودوں کی جڑوں کی بہترین نشوونما، جڑیں گھنی، مضبوط اور پودوں کی شاخوں کی بھرپور بڑھوتری۔
- ☆ تاراسپر دانے دار میں سلفر کی موجودگی زمین کی زرخیزی اور فصل کی پیداوار میں اضافہ کا باعث۔
- ☆ تاراسپر دانے دار میں موجود 46 فیصد جیسم سے زمین کی زرخیزی اور فصل کی پیداوار پر مثبت اثرات اور زمین کی اصلاح میں معاونت کے ساتھ ساتھ اس کھاد میں دوسرے چند اجزاء صغیرہ کی بھی مناسب مقدار میں موجودگی۔
- ☆ تاراسپر دانے دار کا مستقل اور مسلسل استعمال زمین کی زرخیزی میں مستقل اور مسلسل اضافہ کا باعث۔
- ☆ تاراسپر دانے دار کے استعمال سے زمین میں پانی جذب کرنے اور اُسے دیر تک محفوظ رکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور زمین نرم اور بھری رہتی ہے۔ فصل کی جڑیں جلد، زیادہ لمبی اور گہرائی تک پھلتی پھولتی ہیں جو فصل کو زمین کی نچی تہوں سے زیادہ خوراک اور پانی بہم پہنچانے کی علاوہ کرنے سے بھی بچاتی ہیں۔

چاول کی فصل کے لئے کھادوں کا وقت استعمال اور مقدار استعمال (فی ایکڑ)

دھان / چاول	کدو کی تیاری کے وقت / آخری ہل کے وقت	لاب لگانے کے بعد پہلی قسط	لاب لگانے کے بعد دوسری قسط
باسمتی اقسام	ساڑھے 3 تا 4 بوری تاراسپر دانے دار ہمراہ پونی سے ایک بوری تارایوریا + ایک بوری پوٹاش والی کھاد	پونی بوری سے ایک بوری تارایوریا یا پیری منتقل کرنے کے 25 تا 30 دن بعد	آدھی بوری سے ایک بوری تارایوریا یا پیری منتقل کرنے کے 45 تا 55 دن بعد
اری / موٹا چاول	4 تا 5 بوری تاراسپر دانے دار ہمراہ ایک سے ڈیڑھ بوری تارایوریا + ایک بوری پوٹاش والی کھاد	ایک بوری تارایوریا یا پیری کی منتقلی کے 30 تا 35 دن بعد ڈالیں	بقدر ضرورت آدھی سے ایک بوری تارایوریا یا پیری منتقل کرنے کے 50 تا 55 دن بعد

نوٹ: کلراٹھی زمینوں میں یوریا کی بجائے تارا امونیئم سلفیٹ کا استعمال بہتر نتائج دیتا ہے۔ تارا امونیئم سلفیٹ میں 21 فیصد امونیئم نائٹروجن اور 24 فیصد سلفر ہوتا ہے۔ جو زمین کی زرخیزی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ پودوں میں بیماریوں کے خلاف قوتِ مدافعت پیدا کرتا ہے۔ تارا امونیئم سلفیٹ باغات، سبزیات اور تیل دار اجناس میں بہترین پیداوار کا حامل ہے۔

تارا سپر دانے دار

اصلی بوری کی پہچان، اب ہوئی آسان



SICPA ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو دنیا بھر میں کرنسی نوٹ اور اہم حکومتی دستاویزات کی چھپائی کے لئے سکیورٹی ایکٹ کے ساتھ جعلی مصنوعات کی روک تھام کے لئے سکیورٹی فراہم کرتا ہے۔



تارا کی کھاد

خوشحالی کی بنیاد



ایگری ٹیک کے چمکتے تارے

بھرپور اور لہلہاتی فصل کیلئے



Head Office:

Agritech Limited: 2nd Floor, Asia Centre, 8-Babar Block, New Garden Town, Lahore - Pakistan
Tel: +92-42-35860341-45, Fax: +92-42-35860339-40

Urea Plant: Mianwali:

Iskanderabad, Distt. Mianwali - Pakistan.
Tel: +92-459-392346-50

SSP Plant: Haripur:

Near Kangra Colony, Hattar Road, Distt. Haripur - Pakistan.
Tel: +92-995-616124-5



خوشحالی کی بنیاد

تارا کی کھاد

